

UDK 582.475.4:712.23(497.16)

Vladimir Vučanović*, Dragan Karadžić**, Milosav Andelić***

NAŁAZ BORA KRIVULJA (*PINUS MUGO TURRA*) NA LOVCENU

U flori Lovćena zabilježeno je oko 1300 različitih vrsta, od kojih je znatan broj endemskih biljaka užeg ili šireg rasprostranjenja, kao i neki relikti (5). Zastupljen je mali broj vrsta četinarskog drveća sa vidno ograničenim arealom. Od prirode se javlja subendemična vrsta *Pinus heldreichii* Crist.-munika, na nepristupačnim terenima Štirovnika i Jezerskog vrha. A da m o v i Ć (1908) iznosi podatke o ovom boru, osporavajući Pančiću da je u pitanju *Pinus laricio*, a što je sinonim za *Pinus nigra Arn.*(crni bor). Takođe, prisutna je i rijetka dekorativna vrsta *Taxus baccata L.*-iša, na lokalitetima Vučje rupe, Trešnja i dr. To m i Ć - S t a n k o v i Ć (1970) daje detaljne podatke o flori, uključujući dendrofloru Lovćena.

Višegodišnjim pošumljavanjima na ovim prostorima unesene su različite četinarske vrste drveća *Pinus nigra* (vrni bor), *Pinus silvestris L.*(bijeli bor), *Picea abies Kars.* i neke druge na manjim površinama.

U dendroflori Lovćena, po svemu sudeći, do sada nije bila zabilježena vrsta *Pinus mugo Turra*.(=P.Montana Mill.: P.mughus Scopoli) - bor krivulj, klekasti bor ili planinski bor. Mi smo ga pronašli jula 1993. godine na lokalitetu Ivanova korita, između Rupa i Blatišta, na cca 1100 mnv. (Karta 1 , Sl.1).

Utvrđili smo da se radi o *Pinus mugo* var. *mughus* (Scop.) Zenari (sl.2). Anatomsko morfološke karakteristike ovog varijeteta poklapaju se sa podacima J o v a n o - v i Ć a (1951,1971), V u k i Ć e v i Ć a (1987) i V i d a k o v i Ć a(1982). Prema istim autorima, ovaj varijetet dolazi u istočnim Alpima i na Balkanu, gdje čini gornju granicu šumske vegetacije (Karta 2).

Šume krivulja na Lovćenu karakteriše grupimičan raspored poleglih stabala do visine 3,0 m. Dolaze na krečnjačkim blokovima stijena i u depresijama sa ireverzibilnom mikroklimom. Slične šume, na okolnom području, izgrađuje *Juniperus nana* Willd., kao degradacioni oblik zajednice bora krivulja.

Uz pretpostavku da se dokaže prirodno porijeklo sastojinama bora krivulja na Lovćenu (jer bi, prema nekim podacima, ova vrsta bila ovdje vještački zasadena u

* Mr Vladimir Vučanović, Šumarski fakultet-Beograd.

** Dr Dragan Karadžić, Šumarski fakultet-Beograd.

*** Dipl.ing.Milosav Andelić, JP Nacionalni parkovi Crne Gore.

periodu poslije 1950.), otvorilo bi se i pitanje vrste asocijacija. Bilo da se radi o već opisanoj zajednici u Crnoj Gori (*Pinetum mughi montenegrinum* Bleč.), opisanoj u našoj zemlji (Horvat, 1950; Jovanović, 1971 i Račuš, 1976; Štefanović, 1986; Tomić, 1992) ili, možda, o sasvim novoj.

LITERATURA

1. Adamović L.(1908): *Die Panzerföhre im Lovćengebiete*, Magyar Bot. Lapok Z., 200-203.
2. Horvat I.(1950): *Šumske zajednice Jugoslavije*, NZH, s. 59-60, Zagreb.
3. Jovanović B.(1951): *Priručnik za određivanje dendroflore*, Naučna knjiga, s. 14-15, Beograd.
4. Jovanović B. (1971): *Dendrologija sa fitocenologijom*, Naučna knjiga, Beograd.
5. Nacionalni park LOVĆEN:*Prostorni plan područja posebne namene*, Ljubljana, 1983.
6. Naučno veće vegetacijske karte Jugoslavije: *Prirodna potencijalna vegetacija Jugoslavije*, s. 44-45, IUFRO, Ljubljana, 1986.
7. Rauš Dj. (1976): *Šumarska fitocenologija*, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, s.245-247, Zagreb.
8. Stefanović V. (1970): *Fitocenologija*, 208-210, Svetlost, Sarajevo.
9. Tomić-Stanković K. (1970): *Vegetacija Lovćena u Crnoj Gori*, Priština (Posebno izdanje).
10. Tomić Z. (1992): *Šumske fitocenoze Srbije*, Univerzitet u Beogradu, s.104-105, Beograd.
11. Vidaković M. (1982): *Četinjače - morfologija i varijabilnost*, JAZU,456-459, Zagreb.
12. Vukićević (1987): *Dekorativna dendrologija*, Naučna knjiga, s.105-107, Beograd.

PRILOZI

NP. LOVĆEN




✗ lokalitet krivulja (*Pinus mugo Turra*)


Karta 1.
- Lokalitet
bora krivulja
(*Pinus mugo*
Turra)
na Lovćenu



Slika 1.-Sastojina bora krivulja na blokovima krečnjačkih stijena, lokalitet "Rupe" (original)



Slika 2.- Grana sa četinarima i tipovi šišarki *Pinus mugo* var. *mughus* (Scop.) Zenari (original)



Karta 2.- Rasprostranjenost *Pinus mugo* (prema Critchfieldu i Littleu, 1966). Neke izolovane populacije obilježene crno (Izvor: Vidaković, 1982)