

ЦРНОГОРСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕГНОСТИ
ГЛАСНИК ОДЈЕЉЕЊА ПРИРОДНИХ НАУКА, 10, 1994.
ЧЕРНОГОРСКА АКАДЕМИЈА НАУК И ИСКУССТВ
ГЛАСНИК ОТДЕЛЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК, 10, 1994.
THE MONTENEGRIN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS
GLASNIK OF THE SECTION OF NATURAL SCIENCES, 10, 1994.

UDK 531.36

Ranislav Bulatović*

NESTABILNOST RAVNOTEŽE U ANALITIČKOM POTENCIJALNOM POLJU

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ РАВНОВЕСИЯ В АНАЛИТИЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЬНОМ ПОЛЕ

Izvod

У овом раду се дјају довољни услови нестабилности равнотеже холономних механичких система у случајевима када је прва нетривијална форма потенцијалне енергије ненегативна. Показује се да се добијени резултати могу проширити на Чаплигинове нехолономне системе.

Аннотация

В данной статье получены достаточные условия неустойчивости равновесия голономных механических систем в случаях, когда первая нетривиальная форма потенциальной энергии неотрицательна. Показано, что эти результаты распространяются на неголономные системы Чаплыгина.

1. Razmatra se mehanički sistem sa n stepeni slobode, opisan Lagrangeovom funkcijom

$$L(x, \dot{x}) = T(x, \dot{x}) - \Pi(x), \quad x \in \mathbb{R}^n$$

gdje je $2T = \langle K(x)\dot{x}, \dot{x} \rangle$ dvostruka kinetička energija sistema (K — simetrična pozitivno definitna matričica, \langle , \rangle — skalarni proizvod u \mathbb{R}^n), а $\Pi(x)$ — потенцијална енергија система. Prepostavlja se da su funkcija Π i koeficijenti matrice K analitičke funk-

* Prof. dr Ranislav Bulatović, Mašinski fakultet, Podgorica

cije koordinata x . Kretanje sistema se opisuje Lagrangevim jednačinama

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = 0. \quad (1.1)$$

Ravnotežni položaji sistema poklapaju se sa kritičnim tačkama potencijalne energije.

Krajem prošlog vijeka formulisana je hipoteza (Ljapunov (1897)): ako u ravnotežnom položaju potencijalna energija nema lokalni minimum, ravnoteža je nestabilna.

Uprkos nastojanjima mnogih autora, ova hipoteza nije u potpunosti potvrđena (v. prikaze: Hagedron (1971), Karapetjan et al. (1983), Peiffer (1989)). Napomenimo da za neanalitičke sisteme, kako pokazuje poznati primjer (Painlevé (1904)), hipoteza nestabilnosti ne važi. U ovom radu daju se dva kriterijuma nestabilnosti koji dopunjaju poznate rezultate.

2. Ne umanjujući opštost, može se smatrati da je $x = 0$ ravnotežni položaj i da je $\Pi(0) = 0$. MacLaurinov red potencijalne energije je

$$\Pi(x) = \Pi_k(x) + \Pi_j(x) + \dots, j > k \geq 2 \quad (2.1)$$

gdje su $\Pi_i(x)$ — homogene forme stepena i . Obično je $k = 2$. Kada prva netrivijalna forma $\Pi_k(x)$ može uzimati negativne vrijednosti, ravnotežni položaj je nestabilan (Kozlov (1982), Kozlov et al. (1982)). Primijetimo da se ovaj rezultat poklapa s analitičkim slučajem kasnije dobijenog rezultata (Sosnickij (1985)), a za $k = 2$ predstavlja klasni rezultat (Ljapunov (1897)). Ako je $\Pi_k(x)$ pozitivno definitna forma, tada funkcija $\Pi(x)$ u tački $x = 0$ ima strogi minimum i prema Lagrange-Dirichlet-ovoj teoremi, ravnotežni položaj je stabilan. Dakle, ostaje otvoreno pitanje: Šta je u slučaju kada je prva netrivijalna forma potencijalne energije pozitivno semidefinitna. Djelimičan odgovor daje sljedeća teorema.

Teorema 1. Neka je

$$\Pi(x) = \sum_k^{l-1} \Pi_i(x) + \Pi_l(x) + \dots, \sum_k^{l-1} \Pi_i(x) \geq 0.$$

Ako su ispunjeni uslovi:

$$(a) \sum_k^{l-1} (l-i) \Pi_i(x) \geq 0;$$

(b) postoji jedinični vektor $e \in R^n$ tako da je $\Pi_i(e) < 0$ i

$$\sum_{k=1}^{i-1} \Pi_k(ue) = 0 \text{ za svako } u \in R;$$

ravnotežni položaj $x = 0$ je nestabilan.

Kako je za $\Pi_i(x) \geq 0$ ($i = k, \dots, i-1$) automatski ispunjen uslov (a), to teorema 1, za $k > 2$, uopštava nedavni rezultat (Pfeiffer (1989)).

Praktično najinteresantniji slučaj je kada je $k = 2$, tj. $\Pi_2(x) \geq 0$. Tada, kao što je poznato iz linearne algebri, skup tačaka $\pi = \{x \in R^n : \Pi_2(x) = 0\}$ je $m = m$ -dimenzionalna ravan koja prolazi kroz koordinatni početak. Govoreći jezikom teorije oscilacija, m sopstvenih frekvencijskih sistema je jednako nuli. Kada je $m = 1$, hipoteza nestabilnosti je dokazana bez dodatnih uslova (Koiter (1965)). Za $m > 2$, nestabilnost je dokazana uz izvjesne dodatne uslove koje jednostavno možemo formulisati ako sa \hat{F} označimo sruženje neke funkcije F na π . Prvo je za $m = 2$ i $\hat{\Pi}_3 \neq 0$, dokazana nestabilnost (Laloy (1979)), a zatim za proizvoljno m uz uslov da u tački $x = 0$ forma $\hat{\Pi}_j : \pi \rightarrow R$ nema lokalni minimum (Kozlov (1986)).

Teorema 2. Neka je potencijalna energija oblika (2.1) i $\Pi_2(x) \geq 0$. Ako je $\hat{\Pi}_j \equiv \dots \equiv \hat{\Pi}_{r-1} \equiv 0$, $r \geq j + 1$, a u tački $x = 0$, funkcija $\hat{\Pi}_r : \pi \rightarrow R$ nema lokalni minimum, ravnotežni položaj $x = 0$ je nestabilan.

Kada je $\Pi_i(x) \neq 0$, teorema 2 se, očigledno, svodi na poznati rezultat (Kozlov (1986)). Za razliku od pomenutog rezultata, ova teorema, specijalno, rješava pitanje nestabilnosti u sljedećim karakterističnim slučajevima:

- u tački $x = 0$ funkcija $\hat{\Pi} : \pi \rightarrow R$ ima maksimum,
- prva netrivijalna forma razvoja funkcije $\hat{\Pi}$ je neparnog stepena.

Formulisane teoreme dokazujemo direktnim metodom Ljapunova, pokazujući da se pomoćna funkcija bliska po svojoj strukturi ranije korišćenoj funkciji (Sosnickij (1985)), može izabrati tako da na nultom nivou ukupne energije zadovoljava uslove opšte teoreme Četaeva o nestabilnosti kretanja.

3. 1° Razmotrimo skup funkcija $f(x) = c|x|^{1+1/2} F(x)$,

$$F(x) = [1 - 2c^{-2} \int_0^{|x|} (\Phi(v)/v^{1+1}) dv]^{1/2}, \quad (3.1)$$

gdje je $0 < c = \text{const.} \dots, 1 \in N$ i $\Phi : R \rightarrow R$ neprekidna nene-

gativna funkcija koja za neko $a \in]0,1[$ zadovoljava uslov:
 $\Phi(v)/|v|^{1+a} \rightarrow 0$ kada $v \rightarrow 0$. Uočimo u faznom prostoru

$R^n(x) \times R^n(x)$ skup

$M = \{ (x, x): |x| + |x| < \epsilon, \langle x, K(x)x \rangle - f(x) > 0 \}$ (3.2)
gdje je ϵ dovoljno mali pozitivan broj. Na skupu M je zadovoljena nejednačina

$$(1 + \frac{1}{2}) \langle Kx, Kx \rangle - \langle \frac{\partial f}{\partial x}, Kx \rangle > \Phi(|x|). \quad (3.3)$$

Zaista, ako sa $g(x, x)$ označimo lijevu stranu gornje nejednačine, biće

$$g = |Kx| [(1 + \frac{1}{2}) |Kx| - u f'_x], \quad u = \langle Kx, x \rangle / |x| |Kx|,$$

odakle, s obzirom na (3.2), važi

$$\begin{aligned} g|_M &> \min_u [c^2 (1 + \frac{1}{2}) |x|^2 (1 - u) F^2(x) + u \Phi(|x|)] = \\ &= \Phi(|x|). \end{aligned}$$

2° Ne umanjujući opštost razmatranja, možemo smatrati da je $K(0) = I$ — jedinična matrica. U protivnom to se može postići pomoću linearne transformacije koordinata. Tada, kao što je poznato (Sosnicki (1985)), važi

$$(1 - \Delta_1(x)) |x|^2 \leq \langle K(x)x, x \rangle \leq (1 + \Delta_2(x)) |x|^2 \quad (3.4)$$

gdje su: $0 \leq \Delta_i(x) = o(1)$.

Razmotrimo u faznom prostoru invarijantni skup, određen nultom vrijednošću mehaničke energije, tj.

$$H = \frac{1}{2} \langle K(x)x, x \rangle + \Pi(x) = 0. \quad (3.5)$$

S obzirom na pretpostavku $\Pi_k + \dots + \Pi_{l-1} \geq 0$ i činjenicu da je $\Pi_l(x) \geq \lambda_l |x|^l$, $\lambda_l = \min_{|x|=1} \Pi_l(x)$, pri čemu je na osnovu uslova (b) teoreme 1 $\lambda_l < 0$, iz (3.5), imajući u vidu lijevu polovinu nejednačine (3.4), slijedi

$$|x|_{H=0} \leq \sqrt{-2\lambda_l} |x|^{l/2} (1 + o(1)), \quad (3.6)$$

3° Na skupu

$E = \{ (x, x): |x| + |x| < \epsilon, \langle K(x)x, x \rangle + 2\Pi(x) = 0 \}$ uvedimo pomoćnu funkciju $V(x, x) = \langle x, K(x)x \rangle - f(x)$, pri čemu se $f(x)$ bira tako što se u (3.1) stavi $\Phi(v) = |v|^{1+b}$, $b \in]0, 1[$, a konstanta c se podvrgne uslovu $c < \sqrt{-2\Pi_l(e)}$, gdje je e vektor

iz uslova (b) teoreme 1. Stavljujući $x = ue$ i $\dot{x} = U K^{-1}(ue)e$ u (3.5), slijedi nejednačina

$$|U| \geq \sqrt{-2\Pi_1(e)} |u|^{1/2} (1 + o(1))$$

pa je

$V(x = |u|e, \dot{x} = |U|K^{-1}(ue)e) \geq (\sqrt{-2\Pi_1(e)} - c) |u|^{1+1/2} (1 + o(1))$
Dakle, s obzirom na izbor konstante c , za svako $\eta \in]0, \varepsilon]$ postoje tačke $(x, \dot{x}) \in E$, takve da je $|x| + |\dot{x}| < \eta$ i $V(x, \dot{x}) > 0$.

Izvod iz pomoćne funkcije po vremenu, u smislu diferencijalnih jednačina (1.1) je

$$\dot{V} = 2T - \left\langle x, \frac{\partial \Pi}{\partial x} \right\rangle - \left\langle \dot{x}, \frac{\partial f}{\partial x} \right\rangle + \left\langle x, R(x, \dot{x}) \right\rangle, \quad (3.7)$$

gdje je $R(x, \dot{x})$ neka vektorska funkcija drugog stepena po x . Ako se iskoristi Eulerova teorema o homogenim funkcijama, na osnovu jednačine (3.5) prethodni izraz se može napisati u obliku

$$\begin{aligned} \dot{V} = (1 + \frac{1}{2}) \left\langle Kx, x \right\rangle - \left\langle Kx, \frac{\partial f}{\partial x} \right\rangle + \sum_{k=1}^{l-1} \\ (l-i) \Pi_i(x) + \sum_{i>1} (l-i) \Pi_i(x) - \left\langle Ax, \frac{\partial f}{\partial x} \right\rangle + P(x, \dot{x}), \end{aligned}$$

gdje je $P(x, \dot{x})$ neka kvadratna forma u odnosu na generalisane brzine, koja se anulira za $x = 0$. Na osnovu pretpostavke (a) teorme 1, ocjena (3.3) i (3.6), s obzirom na izbor funkcije, f , zaključujemo da za svako $(x, \dot{x}) \in E \cap V(x, \dot{x}) > 0$ važi

$$\dot{V} > |x|^{1+b} (1 + o(1)).$$

Prema tome, ispunjeni su uslovi opšte teoreme nestabilnosti (Rouché et al. (1977)) i, dakle, ravnoteža $x = 0$ razmatranog sistema je nestabilna.

4. Teorema 2 se izvodi iz teoreme 1. Prvo, linearnom transformacijom prelazimo na normalne koordinate. U normalnim koordinatama x , s obzirom da razmatramo slučaj $\Pi_2 \geq 0$, je

$$\overline{\Pi(x)} = -\frac{1}{2} \left\langle \overline{Dx}, \overline{x} \right\rangle + \overline{\Pi_j(x)} + \dots \quad (4.1)$$

$$\overline{K(x)} = I + \overline{A}, \quad \overline{A}(0) = 0,$$

gdje je $\overline{D} = \text{diag}(\omega^2_1, \dots, \omega^2_{n-m}, 0, \dots, 0)$. Ako uvedemo označke

$\bar{y} = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_{n-m})$ i $\bar{z} = (\bar{x}_{n-m+1}, \dots, \bar{x}_n)$, na osnovu leme o cijepanju funkcije (Gilmore (1981), postoji nelinearna koordinatna transformacija

$y = \bar{y} + b(\bar{y}, \bar{z}), z = \bar{z}$
koja funkciju $\Pi(x)$ transformiše u

$$\Pi^* = \frac{1}{2} \langle D\bar{y}, \bar{y} \rangle + W(\bar{z}), W(\bar{z}) = W_k(\bar{z}) + \dots, k >, 2, \quad (4.3)$$

gdje je $D = \text{diag}(\omega_1^2, \dots, \omega_{n-m}^2)$. Lako se pokazuje da je
 $b(\bar{x}) = b_{j-1}(\bar{x}) + \dots$

gdje su $b_i(\bar{x})$ vektorske forme stepena i . Očigledno je

$\hat{\Pi} \equiv \Pi^* (y=b(y=0, z), z)$,
odakle, s obzirom na pretpostavke teoreme 2, slijedi

$$\hat{\Pi}_r(z) + \dots = \frac{1}{2} \langle Dc(z), c(z) \rangle + W_s(z) + \dots, \quad (4.4)$$

gdje je

$$c(z) = b(y=0, z) = c_p(z) + \dots, p \geq j - 1.$$

Ako je $2p < r$, onda je $s = 2p$ i prema (4.4)

$$W_s = -\frac{1}{2} \langle Dc_p(z), c_p(z) \rangle,$$

a ako je $2p = r$, biće

$$W_s = -\frac{1}{2} \langle Dc_p(z), c_p(z) \rangle + \hat{\Pi}_r(z).$$

Kada je $r < 2p$, onda je $s = r$ i $W_s = \hat{\Pi}_r(z)$. Pošto prema pretpostavci teoreme 2 forma $\hat{\Pi}_r$ nema lokalni minimum, a samog toga matrica D je pozitivno definitna, to u sva tri moguća slučaja prva netrivijalna forma W_s funkcije W može da uzima negativne vrijednosti. Time smo pokazali da su zadovoljeni uslovi teoreme 1 ($k = 2, l = s$), pa je ravnoteža $x = 0$ razmatranog sistema nestabilna.

5. Prethodni rezultati nestabilnosti ravnoteže lako se proširuju na Čapliginove neholonomne sisteme. Zaista, diferencijalne jednačine oblika

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = \Gamma(x, \dot{x}), L = T(x, \dot{x}) - \Pi(x), \quad (5.1)$$

opisuju kretanje takvih sistema nezavisno od jednačina neholomnih

veza (Nejmark & Fufajev (1967).) Ovdje su: $2T = \langle A(x)x, x \rangle$ pozitivno definitna kvadratna forma brzina x , dobijena iz kinetičke energije sistema eliminacijom zavisnih brzina pomoću jednačina neholonomih teza; $\Gamma(x, x)$ — vektorska funkcija čije su komponente kvadratne forme nezavisnih brzina x (neholonomni članovi). Pošto je $\langle \Gamma(x, x), x \rangle = 0$, to jednačine (5.1) dopuštaju integral energije $H = T(x, x) + \Pi(x)$, pa se može primijeniti ranije izloženi postupak. Ako primijetimo da na dokaz teorema 1 i 2 ne utiču članovi iz Lagrangeovih jednačina koji su kvadratne forme generalisanih brzina, s obzirom na strukturu neholonomih članova u jednačinama (5.1), slijedi da teoreme 1 i 2 važe i za Čapliginove neholonomne sisteme.

Na kraju, pretpostavimo da na razmatrani sistem sem potencijalnih sila dejstvuju i giroskopske sile $G = B(x)x$, $B(x)$ — antisimetrična matrica. Neka je

$$B(x) = B_q(x) + \dots, q \geq 0$$

MacLaurinov red matrice B . Pošto je snaga giroskopskih sila jednaka nuli, to one ne mijenjaju mehaničku energiju, pa se opet može iskoristiti postupak dokaza teorema 1 i 2. Pri tome, izraz (3.7) treba dopuniti članovima koji potiču od giroskopskih sila. Lako se provjerava da ako giroskopske sile zadovoljavaju uslov:

$$q > [(l-2)/2],$$

ocjena (3.6) ostaje da važi. Prema tome, teoreme 1 i 2, uz dopunski uslov $q > [(l-2)/2]$, daju kriterijume nestabilnosti ravnoteže giroskpskog Čapliginovog sistema.

LITERATURA

1. Gilmore R. (1981), *Catastrophe theory for scientists and engineers*. A Wiley-Inaerscience Publication, New York.
2. Hagedorn P. (1971), *Die Umkehrung der Stabilitätssätze von Lagrange-Dirichlet und Rout.* Arch. Ration. Mech. and Analys., 42, № 4, p.281—315.
3. Карапетян А. В., Румянцев В. В. (1983), Устойчивость консервативных и диссипативных систем. ВИНИТИ, Москва.
4. Koiter W. T. (1965), *On the instability of equilibrium in the absence of a minimum of potential energy*. Ned. Akad. Wetensch. Proc. Ser. B68, p. 107—113.
5. Козлов, В. В. (1982), Асимптотические решения уравнений классической механики, ПММ, т. 46, вып. 4, с. 573—577.
6. Козлов В. В., Паламодов В. П. (1982), Об асимптотических решениях уравнений классической механики, Докл. АН СССР, т. 263, № 2, с. 285—289.
7. Козлов В. В. (1986), Асимптотические движения и проблема обращения теоремы Лагранжа—Дирихле. ПММ, т. 50, вып. 6, с. 928—937.

8. Laloy M. (1979), *On the inversion of the Lagrange-Dirichlet theorem in the case of an analytic potential*. Int. J. Non-Linear Mechanics. Vol. 14, pp. 59–65.
9. Lyapunov A. M. (1897), *Sur l'instabilité de l'équilibre dans certains cas où la fonction des forces n'est pas un maximum*. Jour. de Math., ser. V, 3-Fasc. I, 81–94.
10. Неймарк Ю. И., Фуфаев Н. А. (1967), *Динамика неголономных систем*, Наука, Москва.
11. Painlevé P. (1904), *Sur la stabilité de l'équilibre*, C. R. Acad. Sci. Paris, 138, p. 1555–1567.
12. Peiffer K. (1989), *On the inversion of Lagrange-Dirichlet's theorem*, Rapport 162, Sémin. Math. N. S., Univ. Cath. Louvain, p. 1–16.
13. Routh N., Habets P., Laloy M. (1977), *Stability theory by Lyapunov's direct Method*, Springer, New York.
14. Сосницкий С. П. (1985), *О некоторых случаях неустойчивости равновесия натуральных систем*, Укр. мат. ж., Т. 37, № 1, с. 124–127.

Ранислав Булатович

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ РАВНОВЕСИЯ В АНАЛИТИЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЬНОМ ПОЛЕ

Резюме

Исследуется неустойчивость равновесия голономных механических систем в силовом поле с потенциалом вида

$$\Pi(x) = \sum_{i=1}^k \Pi_i(x) + \Pi_1(x) + \dots, k \geq 2, x \in \mathbb{R}^n$$

где $\sum_{i=1}^n \Pi_i(x) \geq 0$. Прямым методом Ляпунова доказываются следующие утверждения.

Теорема 1. Если выполнены предположения

$$(a) \quad \sum_{i=1}^k (1-i) \Pi_i(x) \geq 0,$$

б) существует единичный вектор $e \in \mathbb{R}^n$, такой, что $\Pi_i(e) < 0$ и

$$\sum_{i=1}^k \Pi_i(ue) = 0 \text{ для каждого } u \in \mathbb{R};$$

то равновесие $x = 0$ неустойчиво.

Теорема 2. Если $\Pi_2(x) \geq 0$ и первая нетривиальная форма разложения функции $\Pi(x)$ на плоскости $\pi = \{x: \Pi_2(x) = 0\}$ принимает отрицательные значения, то равновесие $x = 0$ неустойчиво.

Из этих теорем вытекают некоторые известные результаты (Laloy (1979), Козлов (1986), Peiffer (1989)). Показано, что теоремы 1 и 2 распространяются на неголономные системы Чаплыгина.